

USG układu moczowego

USG układu moczowego stosuje się w przypadku podejrzenia chorób prostaty, pęcherza czy nerek, USG jest podstawowym metodą diagnostyki. Urolog może zlecić tylko to badanie lub może być przeprowadzone wchodząc w skład całkowitej diagnostyki jamy brzusznej. W jej ramach wykonuje się diagnostykę nerek, dróg moczowych, oraz w przypadku prostaty.

- zastoju w nerkach
- kamicy nerkowej
- chorób rozrostowych pęcherz moczowego i nerek
- kamicy pęcherza moczowego lub moczowodu

Jak przygotować się do USG układu moczowego ?

Warunkiem prawidłowego obrazowania ultrasonograficznego przez powłoki brzuszne narządów miednicy małej jest wypełnienie pęcherza moczowego. Pęcherz moczowy wypełniony moczem wypycha pętle jelitowe z miednicy małej i stanowi swoiste „okno ultrasonograficzne” umożliwiające obserwację narządów rodnych kobiety, gruczołu krokowego mężczyzny oraz pęcherza moczowego.

Jeden dzień przed badaniem:

- dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa
- u osób ze znaczną nadwagą proszę zastosować preparat który ma na celu usunięcie powietrza z przewodu pokarmowego, które stanowi przeszkodę dla ultradźwięków

6 godzin przed badaniem:

- nie przyjmować pokarmów
- nie palić tytoniu
- nie żuć gumy

2 godziny przed badaniem:

- wypić 1-1,5 litra wody niegazowanej i nie oddawać moczu
-

